

## Baccalauréat S – Nouvelle-Calédonie – novembre 2007

### Exercice 1 (4 points) (Commun à tous les candidats) :

Pour chaque question, une seule des trois propositions est exacte. Le candidat indiquera sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

*Une réponse exacte rapporte 0,5 point ; une réponse inexacte enlève 0,25 point ; l'absence de réponse est comptée 0 point. Si le total est négatif, la note est ramenée à zéro.*

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct d'origine  $O$ .

- 1) Une solution de l'équation  $2z + \bar{z} = 9 + i$  est :  
a) 3                                      b)  $i$                                       c)  $3 + i$
- 2) Soit  $z$  un nombre complexe ;  $|z + i|$  est égal à :  
a)  $|z| + 1$                                 b)  $|z - 1|$                                 c)  $|i\bar{z} + 1|$
- 3) Soit  $z$  un nombre complexe non nul d'argument  $\theta$ . Un argument de  $\frac{-1 + i\sqrt{3}}{z}$  est :  
a)  $-\frac{\pi}{3} + \theta$                               b)  $\frac{2\pi}{3} + \theta$                               c)  $\frac{2\pi}{3} - \theta$
- 4) Soit  $n$  un entier naturel. Le complexe  $(\sqrt{3} + i)^n$  est un imaginaire pur si et seulement si :  
a)  $n = 3$                                       b)  $n = 6k + 3$                               c)  $n = 6k$   
avec  $k$  entier relatif                      avec  $k$  entier relatif
- 5) Soient  $A$  et  $B$  deux points d'affixes respectives  $i$  et  $-1$ . L'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  vérifiant  $|z - i| = |z + 1|$  est :  
a) la droite  $(AB)$                         b) le cercle de diamètre  $[AB]$                         c) la droite perpendiculaire à  $(AB)$  passant par  $O$ .
- 6) Soit  $\Omega$  le point d'affixe  $1 - i$ . L'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z = x + iy$  vérifiant  $|z - 1 + i| = |3 - 4i|$  a pour équation :  
a)  $y = -x + 1$                               b)  $(x - 1)^2 + y^2 = \sqrt{5}$                               c)  $z = 1 - i + 5e^{i\theta}$  avec  $\theta$  réel.
- 7) Soient  $A$  et  $B$  les points d'affixes respectives 4 et  $3i$ . L'affixe du point  $C$  tel que le triangle  $ABC$  soit isocèle avec  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$  est :  
a)  $1 - 4i$                                       b)  $-3i$                                       c)  $7 + 4i$

8) L'ensemble des solutions dans  $\mathbb{C}$  de l'équation  $\frac{z-2}{z-1} = z$  est :

a) $\{1 - i\}$	b) L'ensemble vide.	c) $\{1 - i, 1 + i\}$
----------------	---------------------	-----------------------

**Exercice 2 (Commun à tous les candidats) (5 points) :**

Un responsable de magasin achète des composants électroniques auprès de deux fournisseurs dans les proportions suivantes : 25 % au premier fournisseur et 75 % au second.

La proportion de composants défectueux est de 3 % chez le premier fournisseur et de 2 % chez le second.

On note :

- D l'événement « le composant est défectueux ».
- $F_1$  l'événement « le composant provient du premier fournisseur ».
- $F_2$  l'événement « le composant provient du second fournisseur ».

- 1) a. Dessiner un arbre pondéré.  
b. Calculer  $p(D \cap F_1)$ , puis démontrer que  $p(D) = 0,0225$ .  
c. Sachant qu'un correspondant est défectueux, quelle est la probabilité qu'il provienne du premier fournisseur ?

Dans toute la suite de l'exercice, on donnera une valeur approchée des résultats à  $10^{-3}$  près.

- 2) Le responsable commande 20 composants. Quelle est la probabilité qu'au moins deux d'entre eux soient défectueux ?
- 3) La durée de vie de l'un des composants est une variable aléatoire notée  $X$  qui suit la loi de durée de vie sans vieillissement ou loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ , avec  $\lambda$  réel strictement positif.
  - a. Sachant que  $p(X > 5) = 0,325$ , déterminer  $\lambda$ .  
Pour les questions suivantes, on prendra  $\lambda = 0,225$ .
  - b. Quelle est la probabilité qu'un composant dure moins de 8 ans ? plus de 8 ans ?
  - c. Quelle est la probabilité qu'un composant dure plus de 8 ans sachant qu'il a déjà duré plus de 3 ans ?

### Exercice 3 (Commun à tous les candidats) (6 points) :

#### Partie A : Question de cours

- 1) Soit  $f$  une fonction réelle définie sur  $[a ; +\infty[$ . Compléter la phrase suivant :  
On dit que  $f$  admet une limite finie  $\ell$  en  $+\infty$  si ...
- 2) Démontrer le théorème « des gendarmes » : Soient  $f$ ,  $g$  et  $h$  trois fonctions définies sur  $[a ; +\infty[$  et  $L$  un nombre réel. Si  $g$  et  $h$  ont pour limite commune  $L$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ , et si pour tout  $x$  assez grand  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ , alors la limite de  $f$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$  est égale à  $L$ .

#### Partie B

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^x - x - 1$   
et soit  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormal du plan.

La droite  $(D)$  d'équation  $y = -x - 1$  est asymptote à  $(C)$ .

On a représenté sur la feuille annexe la courbe  $(C)$  et la droite  $(D)$ .

- 1) Soit  $a$  un nombre réel. Ecrire, en fonction de  $a$ , une équation de la tangente  $(T)$  à  $(C)$  au point  $M$  d'abscisse  $a$ .
- 2) Cette tangente  $(T)$  coupe la droite  $(D)$  en un point  $N$  d'abscisse  $b$ .  
Vérifier que  $b - a = -1$ .
- 3) En déduire une construction, à effectuer sur la feuille annexe, de la tangente  $(T)$  à  $(C)$  au point  $M$  d'abscisse 1,5. On fera apparaître le point  $N$  correspondant.

#### Partie C

- 1) Déterminer graphiquement le signe de  $f$ .
- 2) En déduire pour tout entier naturel non nul  $n$  les inégalités suivantes :

$$(1) e^{\frac{1}{n}} \geq 1 + \frac{1}{n} \qquad (2) e^{\frac{-1}{n+1}} \geq 1 - \frac{1}{n+1}$$

- 3) En utilisant l'inégalité (1), démontrer que pour tout entier naturel non nul  $n$ ,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$$

- 4) En utilisant l'inégalité (2), démontrer que pour tout entier naturel non nul  $n$ ,

$$e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

- 5) Déduire des questions précédentes un encadrement de

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

puis sa limite en  $+\infty$ .

**Exercice 4 (Pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité) (5 points) :**

Soit  $OABC$  un tétraèdre trirectangle (les triangles  $OAB$ ,  $OBC$  et  $OCA$  sont rectangles en  $O$ ).  
On note  $H$  le projeté orthogonal de  $O$  sur le plan  $(ABC)$ .

Le but de l'exercice est d'étudier quelques propriétés de ce tétraèdre.

- 1) (a) Pourquoi la droite  $(OH)$  est-elle orthogonale à la droite  $(BC)$  ?  
Pourquoi la droite  $(OA)$  est-elle orthogonale à la droite  $(BC)$  ?  
  
(b) Démontrer que les droites  $(AH)$  et  $(BC)$  sont orthogonales.  
On démontre de façon analogue que les droites  $(BH)$  et  $(AC)$  sont orthogonales.  
Ce résultat est ici admis.  
  
(c) Que représente le point  $H$  pour le triangle  $ABC$  ?
- 2) L'espace est maintenant muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . On considère les points  $A(1; 0; 0)$ ,  $B(0; 2; 0)$  et  $C(0; 0; 3)$ .  
  
(a) Déterminer une équation cartésienne du plan  $(ABC)$ .  
  
(b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $D$  passant par  $O$  et orthogonale au plan  $(ABC)$ .  
  
(c) Démontrer que le plan  $(ABC)$  et la droite  $D$  se coupent en un point  $H$  de coordonnées  $\left(\frac{36}{49}, \frac{18}{49}, \frac{12}{49}\right)$ .
- 3) (a) Calculer la distance du point  $O$  au plan  $(ABC)$ .  
  
(b) Calculer le volume du tétraèdre  $OABC$ . En déduire l'aire du triangle  $ABC$ .  
  
(c) Vérifier que le carré de l'aire du triangle  $ABC$  est égal à la somme des carrés des aires des autres faces de ce tétraèdre.

**ANNEXE (à rendre avec la copie)**

